

CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

GROUPE 6 B Changement de couleur complet et souvent rapide vers le bleu.

6 B-1 Pied réticulé.





















Vers 6 B-2 et 6 B-3

Pied réticulé, chapeau rouge brunâtre, jaunissant avec l'âge, pied de la même couleur, surf. des tubes rougeâtre.


Pied réticulé, chapeau jaune à jaune olive, souvent teinté de rougeâtre, pied jaune, surf. des tubes orange.

Pied réticulé, surface des tubes jaune à jaune olivacé, chapeau rose pourpré, teinté de rougeâtre...

Pied réticulé (ou non), surface des tubes jaune. Chapeau brun à gris olive.

				6.20 Bolet flamboyant <i>Boletus flammans</i>  
Chapeau jaune à jaune olive, souvent teinté de rouge.	Pied entièrement jaune ou teinté de rouge vers l'apex et jaune vers le bas.	Surface des tubes rouge foncé puis orangée, bleu verdâtre au froissement.	Chair bleuisant totalement à la coupe; ligne rouge au-dessus de la couche de tubes.	6.21 Bolet blafard <i>Boletus luridus</i> <i>Suilellus luridus</i>  
				6.22 Bolet rose pourpré <i>Boletus roseo-purpureus</i>  
				6.23 Bolet à pied rose <i>Caloboletus roseipes</i> <i>Boletus roseipes</i>  

CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

<p>↓</p>	<p>Surface des tubes pâle à la marge, pied pâle vers le haut et rougeâtre vers le bas.</p>		<p>6.24 Bolet vermiculé <i>Boletus vermiculosus</i></p> <p></p> <p></p>
<p>GROUPE 6 B-2 Pied non réticulé, surface des tubes brune à brun rougeâtre.</p>	<p>Surface des tubes brune à la grandeur, pied brunâtre.</p>		<p>6.25 Bolet faux-vermiculé <i>Suillus vermiculosoides</i></p> <p></p> <p></p>
<p>↓</p>	<p>Pied entièrement rouge à maturité.</p>		<p>6.26 Bolet à pied rouge <i>Boletus subvelutipes</i></p> <p></p> <p></p>
<p>GROUPE 6 B-3 Pied non réticulé, surface des tubes jaune.</p> <p>↓</p>	<p>Chapeau rouge sang à brun rougeâtre foncé; pied jaune, rougissant à partir de la base.</p>		<p>6.27 Bolet un peu rougeoyant <i>Boletus subluridellus</i></p> <p></p> <p></p>



CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETES DU GROUPE 6 B

GROUPE 6 B-3
Pied non réticulé, surface des tubes jaune.

Voir aussi 6.23 Bolet à pied rose dont le pied est réticulé ou non.














Chapeau rose-rouge; pied jaune pâle rougissant par endroits; bleuissement instantané ou froissement ou à la coupe.

Toutes les parties de ce bolet virent instantanément au bleu foncé au froissement ou à la coupe.

Toutes les parties de ce bolet virent instantanément au bleu foncé au froissement ou à la coupe.

Chapeau rouge sang à brun rougeâtre foncé; pied jaune, rougissant à partir de la base.

Toutes les parties des fructifications sont jaunes.

				<p>6.28 Bolet sensible <i>Boletus sensibilis</i></p> 
Chapeau orange rougeâtre ou de couleur rouille.	Pied jaune-orangé, rougeâtre par endroits.	Surface des tubes jaune, jaune olivacé avec l'âge.	Chair jaune bleuisant rapidement à la coupe.	<p>6.29 Bolet hypersensible <i>Boletus sensibillior</i></p> 
Chapeau brun, rougeâtre à brun noirâtre.	Pied jaune, brun vers la base.	Surface des tubes jaune, jaune olivacé avec l'âge.	Chair jaune bleuisant instantanément à la coupe.	<p>6.30 Bolet pulvérulent <i>Boletus pulverulentus</i></p> 
Chapeau rouge rosé au début puis rose pâle, tan rosâtre à la fin.	Pied entièrement jaune ou avec une teinte de rougeâtre ou de brunâtre.	Surface des tubes jaune, jaune olivacé avec l'âge.	Chair blanchâtre à jaune pâle, rougeâtre sous la cuticule, bleuisant parfois lentement à la coupe.	<p>6.31 Bolet rouge olivâtre <i>Boletus miniato-olivaceus</i></p> 
				<p>6.32 Bolet jonquille <i>Boletus pseudo-sulfureus</i></p> 

CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

GROUPE 6 B Changement de couleur complet et souvent rapide vers le bleu.









6 B-1 Pied réticulé.

Pied réticulé, chapeau rouge brunâtre, pied de la même couleur, surf. des tubes rougeâtre.

Pied réticulé, chapeau jaune à jaune olive teinté de rougeâtre, pied jaune, surf. des tubes orange.


Pied réticulé, surface des tubes jaune à jaune olivacé, chapeau rose pourpré, teinté de rougeâtre...

Pied réticulé (ou non), surface des tubes jaune. Chapeau brun à gris olive.

<p>Chapeau rouge brunâtre, jaunissant ou pâlisant avec l'âge, à marge unie. Pied généralement concolore au chapeau, parfois jaunâtre à l'apex, finement réticulé au moins dans la partie supérieure. Chapeau, tubes, pied et chair bleuisant rapidement au froissement ou à la coupe. Surface des tubes rouge orangé à rouge vin, bleuisant instantanément au froissement. Chair jaune pâle dans le chapeau, parfois avec des teintes rougeâtres dans le pied.</p>	<p>6.20 Bolet flamboyant <i>Boletus flammans</i></p>  
<p>Chapeau jaune à jaune olive teinté de rougeâtre devenant olivâtre avec l'âge, marge avec une bande de tissu stérile. Pied entièrement jaune chrome ou teinté de cinabre ou de rouge sang vers l'apex et de jaune vers le bas, ou encore jaune à l'apex et rougeâtre vers le bas, réticulé à l'apex ou jusqu'à la base. Chapeau, tubes, pied et chair devenant bleu verdâtre au froissement ou à la coupe. Surface des tubes rouge foncé au début, vite orange rougeâtre par la suite. Chair épaisse, jaunâtre à rougeâtre dans le chapeau avec une ligne rouge au-dessus des tubes, jaune brillant dans le pied ou strié de rougeâtre à la base.</p>	<p>6.21 Bolet blafard <i>Boletus luridus</i> <i>Suilellus luridus</i></p>  
<p>Chapeau rose pourpré, puis rougeâtre plus foncé, devenant grisâtre à maturité, à marge appendiculée. Surface des tubes jaune citron, devenant jaune olive puis verdâtre à maturité. Pied jaune sur presque toute la longueur, parfois rouge à la base. Chair blanche bleuisant rapidement à la coupe.</p>	<p>6.22 Bolet rose pourpré <i>Boletus roseo-purpureus</i></p>  
<p>Chapeau brun, brun-vert à gris olive, parfois craquelé à maturité, marge appendiculée. Surface des tubes jaune pâle, devenant olivâtre puis brun à maturité, bleuisant au froissement. Pied jaune à l'apex parfois presque à la longueur, bleuisant faiblement au froissement. Chair blanchâtre ou jaunâtre, bleuisant à la coupe.</p>	<p>6.23 Bolet à pied rose <i>Caloboletus roseipes</i> <i>Boletus roseipes</i></p>  

Vers 6 B-2 et 6 B-3

CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B



<p>Chapeau brun grisâtre au début pour devenir brun orangé à brun rougeâtre à maturité. Surface des tubes rouge-brun bleuisant rapidement au froissement, souvent jaunâtre à la marge; pores petits et circulaires. Pied non réticulé, jaune pâle vers l'apex, orangé ou rougeâtre vers le bas. Chair jaune bleuisant rapidement à la coupe, parfois des teintes rougeâtres dans le pied.</p>	<p>6.24 Bolet vermiculé <i>Boletus vermiculosus</i></p>
<p>Fructifications de couleur terne. Chapeau jaunâtre au début devenant brun avec l'âge. Pied non réticulé, jaune vers le haut et recouvert d'une couche poudreuse brune vers le bas. Surface des tubes brun foncé au début, pâlisant en vieillissant, devenant bleu noirâtre au froissement. Chair bleuisant dans le chapeau et le haut du pied à la coupe, souvent jaune à brunâtre dans le pied.</p>	<p>6.25 Bolet faux-vermiculé <i>Suillus vermiculosoides</i></p>
<p>Couleur du chapeau allant du jaune brun au brun rougeâtre. Pied finement velouté à l'extrémité inférieure, de couleur orange-rougeâtre, devenant entièrement rouge à maturité. Surface des tubes rouge à rouge brun, bleuisant au froissement. Chair jaune changeant rapidement de couleur vers le bleu.</p>	<p>6.26 Bolet à pied rouge <i>Boletus subvelutipes</i></p>
<p>Chapeau jaune au début, rouge sang ou brun rougeâtre foncé par la suite. Pied jaunâtre pâle au début rougissant par la suite. Surface des tubes orange-rouge à rouge vineux bleuisant au froissement. Chair jaune changeant rapidement de couleur vers le bleu à la coupe.</p>	<p>6.27 Bolet un peu rougeoyant <i>Boletus subluridellus</i></p>



CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 6 B

GROUPE 6 B-3
Pied non réticulé, surface des tubes jaune.

Voir aussi 6.23 Bolet à pied rose dont le pied est réticulé ou non.











Chapeau rose-rouge; pied jaune pâle rougissant par endroits; bleuissement instantané ou froissement ou à la coupe.

Toutes les parties de ce bolet virent instantanément au bleu foncé au froissement ou à la coupe.

Toutes les parties de ce bolet virent instantanément au bleu foncé au froissement ou à la coupe.

Chapeau rouge sang à brun rougeâtre foncé; pied jaune, rougissant à partir de la base.

Toutes les parties des fructifications sont jaunes.

<p>Chapeau rose-rouge, parfois jaune avec un peu de rose avec l'âge, à marge unie. Pied jaune pâle rougeâtre par endroits, parfois finement réticulé mais uniquement près des tubes. Surface des tubes jaune au départ, olivacée à maturité, bleuisant rapidement au froissement. À la coupe, chair changeant rapidement vers le bleu dans le chapeau, plus jaunâtre dans le pied.</p>	<p>6.28 Bolet sensible <i>Boletus sensibilis</i></p>  
<p>Chapeau rouille à orange brunâtre, à marge unie. Pied jaunâtre vers le haut, rougeâtre vers le bas, parfois jaunâtre à la longueur. Surface des tubes jaune à jaune olivacé, bleuisant au froissement. Chair jaune changeant totalement de couleur vers le bleu à la coupe.</p>	<p>6.29 Bolet hypersensible <i>Boletus sensibillior</i></p>  
<p>Chapeau brun foncé à noir brunâtre, développant souvent des teintes rouges avec l'âge. Pied jaune à l'apex, jaune foncé à jaune rougeâtre vers le bas, rougeâtre à la base. Surface des tubes jaune au début, plus foncée ou brun-jaune à maturité. Chair jaune changeant rapidement vers le bleu à la coupe.</p>	<p>6.30 Bolet pulvérulent <i>Boletus pulverolentus</i></p>  
<p>Chapeau rose ou rouge en jeune âge, devenant brun rosâtre avec des teintes olivacées à maturité. Pied entièrement jaune, marqué de teintes rougeâtres ou brunâtres principalement vers le bas, Surface des tubes jaune au début, puis olivacée avec des teintes rougeâtres à maturité. Chair blanche à jaune pâle, rougeâtre sous la cuticule, bleuisant lentement à la coupe.</p>	<p>6.31 Bolet rouge olivâtre <i>Boletus miniato-olivaceus</i></p>  
<p>Toutes les parties des fructifications sont jaunes et tout bleuit rapidement au froissement ou à la coupe. Pied rougeâtre ou brunâtre à l'extrémité inférieure. Très rare, on le retrouve en compagnie des arbres résineux ou feuillus.</p>	<p>6.32 Bolet jonquille <i>Neoboletus pseudo-sulfureus</i></p>  

BOLETS DU GROUPE 6 B: NOMS DES ESPÈCES.

GROUPE 6 B Changement de couleur complet et souvent rapide vers le bleu.

6 B-1 Pied réticulé.

Pied réticulé, chapeau rouge brunâtre, pied de la même couleur, surf. des tubes rougeâtre.


Pied réticulé, chapeau jaune à jaune olive teinté de rougeâtre, pied jaune, surf. des tubes orange.

Pied réticulé, surface des tubes jaune à jaune olivacé, chapeau rose pourpré, teinté de rougeâtre...

Pied réticulé (ou non), surface des tubes jaune. Chapeau brun à gris olive.

<p>Nom français: Bolet flamboyant Nom anglais: Flame Bolete Noms latins: <i>Boletus flammans</i>, <i>Boletus rubroflammeus</i></p>	<p>6.20 Bolet flamboyant <i>Boletus flammans</i></p>
<p>Noms français: Bolet blafard, Bolet luride, Bolet crème Nom anglais: Noms latins: <i>Boletus luridus</i>, <i>Suilellus luridus</i>, <i>Boletus lubeolarius</i>, <i>Leccinum luridum</i>, <i>leccinum rubeolarium</i>, <i>Boletus nigrescens</i>, <i>Boletus cinnamomeus</i>, <i>Tubiporus lividorubricosus</i> et 28 autres.</p>	<p>6.21 Bolet blafard <i>Boletus luridus</i> <i>Suilellus luridus</i></p>
<p>Noms français: Bolet rose pourpré, Bolet rouge pourpre, Bolet vieux rose Nom anglais: Oldrose Bolete Noms latins: <i>Boletus roseopurpureus</i>, <i>Butyriboletus roseopurpureus</i>, <i>Boletus rhodopurpureus</i>, <i>Boletus splendidus</i>, <i>Boletus purpureus</i>, <i>Imperator rhodopurpureus</i>...</p>	<p>6.22 Bolet rose pourpré <i>Boletus roseo-purpureus</i></p>
<p>Nom français: Bolet à pied rose Noms anglais: Red-stemmed Bitter Bolete, Ros Foot Bolete Noms latins: <i>Caloboletus roseipes</i>, <i>Boletus roseipes</i></p>	<p>6.23 Bolet à pied rose <i>Caloboletus roseipes</i> <i>Boletus roseipes</i></p>

BOLETS DU GROUPE 6 B: NOMS DES ESPÈCES



<p>Noms français: bolet vermiculé Noms anglais: Brown Pored Bolete Noms latins: <i>Boletus vermiculosus</i>, <i>Suillus vermiculosus</i></p>	<p>6.24 Bolet vermiculé <i>Boletus vermiculosus</i></p>
<p>Nom français: Bolet faux-vermiculé Nom anglais: Noms latins: <i>Boletus vermiculosoides</i>, <i>Suillus vermiculosoides</i></p>	<p>6.25 Bolet faux-vermiculé <i>Boletus vermiculosoides</i> <i>Suillus vermiculosoides</i></p>
<p>Noms français: Bolet à pied rouge, Bolet à pied velu Noms anglais: Red-mouth Bolete, Red Mouth Bolete Noms latins: <i>Boletus subvelutipes</i>, <i>Boletus rufocinnamomeus</i>, <i>Suillus subvelutipes</i>, <i>Suilellus subvelutipes</i>. <i>Neoboletus subvelutipes</i>...</p>	<p>6.26 Bolet à pied rouge <i>Boletus subvelutipes</i></p>
<p>Noms français: Bolet un peu rougeoyant, Bolet brun rougeâtre Nom anglais: Nom latin: <i>Boletus subluridellus</i></p>	<p>6.27 Bolet un peu rougeoyant <i>Boletus subluridellus</i></p>



BOLETS DU GROUPE 6 B: NOMS DES ESPÈCES.

GROUPE 6 B-3
Pied non réticulé, surface des tubes jaune.

Voir aussi 6.23 Bolet à pied rose dont le pied est réticulé ou non.

Chapeau rose-rouge; pied jaune pâle rougissant par endroits; bleuissement instantané ou froissement ou à la coupe.

Toutes les parties de ce bolet virent instantanément au bleu foncé au froissement ou à la coupe.

Toutes les parties de ce bolet virent instantanément au bleu foncé au froissement ou à la coupe.

Chapeau rouge sang à brun rougeâtre foncé; pied jaune, rougissant à partir de la base.

Toutes les parties des fructifications sont jaunes.

<p>Noms français: Bolet sensible Noms anglais: Curry Bolete Noms latins: <i>Boletus sensibilis</i></p>	<p>6.28 Bolet sensible <i>Boletus sensibilis</i></p>
<p>Nom français: Bolet hypersensible Nom anglais: Nom latin: <i>Boletus sensibillior</i></p>	<p>6.29 Bolet hypersensible <i>Boletus sensibillior</i></p>
<p>Nom français: Bolet pulvérulent Noms anglais: Inkstain Bolete, Blackening Bolete Noms latins: <i>Boletus pulverulentus, Cyanoboletus pulverolentus, Boletus mutabilis, Uloporus mugeotii, Xerocomus pulverolentus, Ceriomyces cyaneitinctus, Suillus mutabilis...</i></p>	<p>6.30 Bolet pulvérulent <i>Boletus pulverulentus</i></p>
<p>Noms français: Bolet olivâtre, Bolet rouge olivâtre Nom anglais: Noms latins: <i>Boletus miniato-olivaceus, Ceriomyces miniato-olivaceus</i></p>	<p>6.31 Bolet rouge olivâtre <i>Boletus miniato-olivaceus</i></p>
<p>Nom français: Bolet jonquille Nom anglais: Scarletina Bolete Noms latins: <i>Neoboletus pseudosulphureus, Neoboletus junquilleus, Sutorius pseudosulfureus, Boletus pseudosulfureus, Sutorius junquilleus...</i></p>	<p>6.32 Bolet jonquille <i>Neoboletus pseudo-sulphureus</i></p>