

**CLEF D'IDENTIFICATION DU GROUPE 3:
PIED ORNÉ D'UN ANNEAU, D'UN VOILE OU D'UNE GUÊTRE.**

GROUPE 3

GROUPE 3 A
Pied entouré d'une guêtre.

GROUPE 3 B
Pied avec un anneau,
sans guêtre, souvent
glanduleux.

					GROUPE 3 A 6 espèces.
					GROUPE 3 B 6 espèces.

**CLEF D'IDENTIFICATION DU GROUPE 3:
PIED ORNÉ D'UN ANNEAU, D'UN VOILE
OU D'UNE GUÊTRE.**

**GROUPE 3 A
Pied entouré
d'une guêtre.**

Chapeau orné de
nombreuses méchules
rouge vin.

Chapeau brun; voile
secondaire blanc.

Chapeau brun pâle à
brun rougeâtre.

Chapeau brun à brun
rougeâtre foncé.

Chapeau couvert de
plaques vélaire.
s.

Fructifications jaune
soufre.

				3,1 Bolet peint <i>Suillus pictus</i> <i>Fuscoboletinus pictus</i>	
				3,2 Bolet à voile blanc <i>Suillus luteus</i>	
				3,3 Bolet de Greville <i>Suillus grevillei</i> <i>Suillus clin-torianus</i>	
				3,4 Bolet glanduleux <i>Suillus glandulosus</i> <i>Fuscoboletinus glandulosus</i>	
Chapeau couvert de plaques vélaire brun foncé sur fond brun pâle.	Pied jaune pâle à l'apex, rouge-brun sur le reste du pied.	Surface des tubes jaune pâle brunissant avec l'âge.	Chair jaune pâle rougissant ou brunissant un peu à la coupe.	3,5 Bolet remarquable <i>Suillus spectabilis</i>	
Chapeau jaune soufre, souvent rougeâtre au centre.	Pied jaune soufre, souvent radicant.	Surface des tubes jaune, olivacée à maturité.	Chair blanchâtre ou jaune, bleuisant légèrement à la coupe.	3,6 Bolet de Ravenel <i>Pulveroboletus ravenelii</i>	

**CLEF D'IDENTIFICATION DU GROUPE 3:
PIED ORNÉ D'UN ANNEAU, D'UN VOILE
OU D'UNE GUÊTRE.**

GROUPE 3 B

Pied avec un anneau,
sans guêtre, souvent
glanduleux; chapeau
généralement
visqueux.

Voir aussi 4.9
Bolet américain
Suillus americanus

Chapeau brun pâle à
brun jaunâtre.





































Chapeau brun à brun
jaunâtre.

Chapeau rouge vin,
méchuleux.


Chapeau de couleur
saumon.

Chapeau brun, plus
foncé à la marge.

Chapeau brun pâle à
grisâtre ou verdâtre.

				3,7 Bolet acide <i>Suillus acidus</i>	 
			 Chair blanche à jaunâtre	3,8 Bolet alutacé <i>Suillus subalutaceus</i>	 
				3,9 Bolet des marais <i>Suillus paluster Fuscoboletinus paluster</i>	 
				3,10 Bolet saumon <i>Suillus sal- monicolor</i>	 
				3,11 Bolet tardif <i>Suillus serotinus Fuscoboletinus serotinus</i>	 
				3,12 Bolet visqueux <i>Suillus viscidus Fuscoboletinus viscidus</i>	 

**CLEF D'IDENTIFICATION DU GROUPE 3:
PIED ORNÉ D'UN ANNEAU, D'UN VOILE OU D'UNE GUÊTRE.**



	Plusieurs champignons naissent dans une enveloppe qu'on pourrait comparer à un œuf sans coquille. Lorsque la fructification arrive à maturité, le chapeau s'ouvre brisant cette enveloppe pour permettre aux tubes d'émettre leurs spores à l'air libre. Dans plusieurs cas, cette enveloppe reste attachée à la surface du chapeau et du pied. On appelle guêtre la partie qui enveloppe le pied comme le ferait un bas. Dans ce cas, la couleur et les ornements du chapeau et du pied sont identiques puisqu'ils originent du même tissu, le voile universel.	GROUPE 3 A 6 espèces.
	D'autres champignons ne naissent pas dans une telle enveloppe, mais possèdent un voile secondaire qui relie le haut du pied à la marge du chapeau et protège les tubes naissants. Lorsque le chapeau s'ouvre, ce voile se brise laissant un anneau (souvent gélatineux) sur le pied et des tissus stériles sur le rebors du chapeau; on dit alors que le pied est annulé et la marge du chapeau appendiculée.	GROUPE 3 B 6 espèces.

**CLEF D'IDENTIFICATION DU GROUPE 3:
PIED ORNÉ D'UN ANNEAU, D'UN VOILE
OU D'UNE GUÊTRE.**

**GROUPE 3 A
Pied entouré
d'une guêtre.**

Chapeau orné de nombreuses méchules rouge vin.







Chapeau brun; voile secondaire blanc.

Chapeau brun pâle à brun rougeâtre.

Chapeau brun à brun rougeâtre foncé.

Chapeau couvert de plaques vélaïres.

Fructifications jaune soufre.

	<p>Le bolet peint fructifie en compagnie des pins blancs. Son chapeau et son pied sont couverts de nombreuses méchules brunes ou le plus souvent brun-rougeâtres sur fond jaunâtre. Sur les jeunes fructifications, les couleurs sont plus intenses car ces méchules sont plus rapprochées les unes des autres. Les pores des tubes sont anguleux et larges; leur surface jaunâtre rougit ou brunit faiblement au froissement.</p>	<p>3,1 Bolet peint <i>Suillus pictus</i> <i>Fuscoboletinus pictus</i></p> 
	<p>La principale caractéristique de ce bolet est de montrer un voile secondaire blanc qui recouvre la surface des tubes en jeune âge, tandis que la surface cachée teintée brun-violacé. La surface des tubes est jaune pâle en jeune âge, olivacée à maturité et immuable au froissement; les pores vont de ronds à anguleux et sont petits.</p>	<p>3,2 Bolet à voile blanc <i>Suillus luteus</i></p> 
	<p>Un très beau bolet dont la surface lisse du chapeau, qui va du brun orangé au brun rougeâtre, est gluante et visqueuse. La surface des tubes, jaune au début et olivâtre à maturité, brunit au froissement; les pores sont petits, anguleux et irréguliers. Le haut de la guêtre est entouré d'une large bande blanche, surmontée d'une bande brune et au-dessus d'une bande brun pâle.</p>	<p>3,3 Bolet de Greville <i>Suillus grevillei</i> <i>Suillus clin-torianus</i></p> 
	<p>Principalement dans la forêt boréale. Chapeau brun à rougeâtre, couvent marqué de méchules plus foncées à maturité; pied de couleur plus pâle avec une guêtre plus mince et discrète. Pied occasionnellement latéral. Surface des tubes jaune ocre en jeune âge, brunissant avec l'âge, immuable au froissement; pores grands et anguleux. Chair blanchâtre en jeune âge, brunissant par la suite, immuable.</p>	<p>3,4 Bolet glanduleux <i>Suillus glandulosus</i> <i>Fuscoboletinus glandulosus</i></p> 
	<p>Chapeau visqueux, orné de plaques de gluten gris brunâtre à rouge brunâtre. La marge du chapeau est appendiculée de restes vélaïres gélatineux. Les tubes sont longs et leurs pores anguleux, parfois allongés radialement. Leur surface jaune pâle brunit avec l'âge et reste immuable ou brunit au froissement.</p>	<p>3,5 Bolet remarquable <i>Suillus spectabilis</i></p> 
	<p>Fructifications pulvérulentes, d'apparence entièrement jaunâtre ou avec un chapeau orange-rougeâtre, à marge appendiculée. La chair et les tubes bleuissent au froissement ou à la coupe. En association principalement avec les pruches.</p>	<p>3,6 Bolet de Ravenel <i>Pulveroboletus ravenelii</i></p> 

**CLEF D'IDENTIFICATION DU GROUPE 3:
PIED ORNÉ D'UN ANNEAU, D'UN VOILE
OU D'UNE GUÊTRE.**

GROUPE 3 B
Pied avec un anneau,
sans guêtre, souvent
glanduleux; chapeau
généralement
visqueux.

Voir aussi 4.9
Bolet américain
Suillus americanus

Chapeau brun pâle à
brun jaunâtre.







Chapeau brun à brun
jaunâtre.

Chapeau rouge vin,
méchuleux.

Chapeau de couleur
saumon.

Chapeau brun, plus
foncé à la marge.

Chapeau brun pâle à
grisâtre ou verdâtre.

<p>Chapeau glutineux, visqueux, jaune pâle devenant brunâtre et orné de fibrilles radiales à maturité; marge appendiculée de restes de gluten. Tubes courts aux pores larges et anguleux dont la surface brunit légèrement au froissement. Le pied blanchâtre est garni de glandules brunes et orné d'un anneau glutineux. Chair du chapeau blanchâtre à jaune pâle, immuable.</p>	<p>3,7 Bolet acide <i>Suillus acidus</i></p> 
<p>Chapeau glutineux, visqueux, brun pâle à brun foncé, marqué de méchules radiales à maturité. Marge faiblement appendiculée de restes vélaire. Surface des tubes jaune pâle devenant rapidement brunâtre et brun vineux au froissement. Pores ronds à anguleux. Pied orné d'un anneau gélatineux et garni de glandules cannelle sur fond sur fond blanchâtre à jaunâtre.</p>	<p>3,8 Bolet alutacé <i>Suillus subalutaceus</i></p> 
<p>Petit champignon des forêts nordiques. Chapeau non visqueux, rouge et bosselé. Marge souvent appendiculée de restes vélaire. Tubes décurrents, courts, à pores très grands, anguleux et alignés de façon radiale vers la marge. Chair jaunâtre, immuable, rougeâtre sous la cuticule.</p>	<p>3,9 Bolet des marais <i>Suillus paluster</i> <i>Fuscoboletinus paluster</i></p> 
<p>Couleur dominante: brun jaunâtre sur toutes les parties; chapeau gluant et visqueux. Marge appendiculée de restes vélaire. Surface des tubes jaune brunâtre à orange brunâtre, immuable ou brunissant faiblement au froissement; pores anguleux. Chair orange brunâtre immuable.</p>	<p>3,10 Bolet saumon <i>Suillus salmonicolor</i></p> 
<p>Petit champignon se faisant remarquer par sa marge ornée de plaques plus foncées que le reste du chapeau; celui-ci est glutineux, brun foncé en jeune âge et plus pâle par la suite; la marge est appendiculée de restes vélaire. Surface des tubes grise au début, brunâtre par la suite, brunissant faiblement au froissement. Chair blanchâtre.</p>	<p>3,11 Bolet tardif <i>Suillus serotinus</i> <i>Fuscoboletinus serotinus</i></p> 
<p>Chapeau variable allant de gris à jaune, puis à brun. Marge appendiculée d'une étroite bande de tissu stérile. Surface des tubes grisâtre bleuissant ou brunissant faiblement au froissement; pores grands irréguliers, souvent allongés radialement. Chair blanche à jaunâtre, bleuissant faiblement à la coupe.</p>	<p>3,12 Bolet visqueux <i>Suillus viscidus</i> <i>Fuscoboletinus viscidus</i></p> 

**GROUPE 3: PIED ORNÉ D'UN ANNEAU, D'UN VOILE
OU D'UNE GUÊTRE,
NOMS DES ESPÈCES**

**GROUPE 3 A
Pied entourré
d'une guêtre.**

Chapeau orné de
nombreuses méchules
rouge vin.

Chapeau brun; voile
secondaire blanc.

Chapeau brun pâle à
brun rougeâtre.

Chapeau brun à brun
rougeâtre foncé.

Chapeau couvert de
plaques vélaïres.

Fructifications jaune
soufre.

	<p>Nom français: Bolet peint Noms anglais: Painted Suillus, Painted Slippery Cap, Red and Yellow Suillus, Painted Bolete Noms latins: <i>Suillus pictus</i>, <i>Fuscoboletinus pictus</i>, <i>Suillus spragei</i>, <i>Boletus spragei</i>, <i>Boletus pictus</i>, <i>Boletus murrayi</i>...</p>	<p>3,1 Bolet peint <i>Suillus pictus</i> <i>Fuscoboletinus pictus</i></p>
	<p>Noms français: Bolet à voile blanc, Bolet couvert de boue, Bolet jaune, Nonette voilée, Nonette des pins Noms anglais: Slippery Jack, Sticky Bun Noms latins: <i>Suillus luteus</i>, <i>Boletus luteus</i>, <i>Cricunopus luteus</i>, <i>Boletus volvatus</i>, <i>Viscipellis luteus</i>, <i>Ixocomus luteus</i>, <i>belotopsis lutea</i>...</p>	<p>3,2 Bolet à voile blanc <i>Suillus luteus</i></p>
	<p>Noms français: Bolet de Greville, Bolet de Clinton, Bolet élégant Noms anglais: Larch Suillus, Tamarak Suillus, Tamarak Jack, Larch Bolete Noms latins: <i>Suillus grevillei</i>, <i>Suillus clintonarius</i>, <i>Boletinus grevillei</i>, <i>Boletus elegans</i>, <i>Boletus grevillei</i>, <i>Cricunopus elegans</i>, <i>Ixocomus flavus</i>, <i>Suillus cortinatus</i>...</p>	<p>3,3 Bolet de Greville <i>Suillus grevillei</i> <i>Suillus clin- torianus</i></p>
	<p>Nom français: Bolet glanduleux Nom anglais: Boreal Bolete Noms latins: <i>Suillus glandulosus</i>, <i>Fuscoboletinus glandulosus</i>, <i>Boletinus glandulosus</i></p>	<p>3,4 Bolet glanduleux <i>Suillus glandulosus</i> <i>Fuscoboletinus glandulosus</i></p>
	<p>Nom français: Bolet remarquable Nom anglais: Bog Bolete Noms latins: <i>Suillus spectabilis</i>, <i>Fuscoboletinus spectabilis</i>, <i>Boletinus spectabilis</i>, <i>Boletus spectabilis</i></p>	<p>3,5 Bolet remarquable <i>Suillus spectabilis</i></p>
	<p>Nom français: Bolet de Ravenel Noms anglais: Powdery Sulfur Bolete, Ravenel's Bolete Noms latins: <i>Pulveroboletus ravenelii</i>, <i>Boletus ravenelii</i>, <i>Suillus ravenelii</i>, <i>Ixocomus ravenelii</i></p>	<p>3.6 Bolet de Ravenel <i>Pulveroboletus ravenelii</i></p>

**GROUPE 3: PIED ORNÉ D'UN ANNEAU, D'UN VOILE
OU D'UNE GUÊTRE,
NOMS DES ESPÈCES**

GROUPE 3 B

Pied avec un anneau,
sans guêtre, souvent
glanduleux; chapeau
généralement
visqueux.

Chapeau brun pâle à
brun jaunâtre.

Chapeau brun à brun
jaunâtre.

Chapeau rouge vin,
méchuleux.

Chapeau de couleur
saumon.

Chapeau brun, plus
foncé à la marge.

Chapeau brun pâle à
grisâtre ou verdâtre.

Nom français: Bolet acide Nom anglais: Acidulated Bolete Nom latin: <i>Suillus acidus</i>	3,7 Bolet acide <i>Suillus acidus</i>
Nom français: Bolet alutacé Nom anglais: Alutaceus Bolete Nom latin: <i>Suillus subalutaceus</i>	3,8 Bolet alutacé <i>Suillus subalutaceus</i>
Nom français: Bolet des marais Noms anglais: Swamp Bolete, Red Bog Bolete Noms latins: <i>Suillus paluster, Fuscoboletinus paluster</i>	3,9 Bolet des marais <i>Suillus paluster</i> <i>Fuscoboletinus paluster</i>
Nom français: Bolet saumon Nom anglais: Slippery Jill Nom latin: <i>Suillus salmonicolor</i>	3,10 Bolet saumon <i>Suillus salmonicolor</i>
Nom français: Bolet tardif Nom anglais: Late Bolete Noms latins: <i>Suillus serotinus, Fuscoboletinus serotinus, Suillus ebensis</i>	3,11 Bolet tardif <i>Suillus serotinus</i> <i>Fuscoboletinus serotinus</i>
Nom français: Bolet visqueux Nom anglais: Viscous Bolete Noms latins: <i>Suillus viscidus, Fuscoboletinus viscosus, Suillus laricinus, Suillus aeruginescens, Fuscoboletinus laricinus, Fuscoboletinus viscidus</i>	3,12 Bolet visqueux <i>Suillus viscidus</i> <i>Fuscoboletinus viscidus</i>