

CLEF DU SOUS-GROUPE 5 D: PIED RUGUEUX, VERS LE GRIS-VIOLET.

5 D Chapeau lisse, chair changeant de couleur vers le gris violet.

Chapeau jaune à orangé, parfois vers le rouge brique.
















































Chapeau rouge brique plus pâle avec l'âge.

Pied entièrement couvert de rugosités noires, même en jeune âge.

Chapeau dans diverses teintes de rouge brique à brun orangé.

Chapeau brun à brun grisâtre et absence de teintes orangées ou rougeâtres.

Chapeau brun-gris foncé palissant avec l'âge; marge lisse, non appendiculée.

						5.21 Bolet orangé <i>Leccinum aurantiacum</i>	 
						5.22 Bolet des épinettes <i>Leccinum piceinum</i>	 
						5.23 Bolet à pied noir <i>Leccinum atrospitatum</i>	 
						5.24 Bolet insigne <i>Leccinum insigne</i>	 
						5.25 Bolet insolite <i>Leccinum insolens</i>	 
						5.26 Bolet gris-noir <i>Leccinum griseonigrum</i>	 

CLEF DU SOUS-GROUPE 5 D: PIED RUGUEUX, VERS LE GRIS-VIOLET

5 D Chapeau lisse, chair changeant de couleur vers le gris violet.

Chapeau jaune à orangé, parfois vers le rouge brique.













Chapeau rouge brique plus pâle avec l'âge.

Pied entièrement couvert de rugosités noires, même en jeune âge.

Chapeau dans diverses teintes de rouge brique à brun orangé.

Chapeau brun à brun grisâtre et absence de teintes orangées ou rougeâtres.

Chapeau brun-gris foncé palissant avec l'âge; marge lisse, non appendiculée.

	<p>Sous les peupliers, parfois sous les résineux principalement dans les plantations. La couleur du chapeau va de jaune à orangé, à rouge brique. Pied blanc au départ, les rugosités n'apparaissent qu'avec l'âge. Le changement de couleur de la chair à la coupe se fait principalement au haut du pied. La marge est appendiculée et les tubes brunissent au froissement.</p>	<p>5.21 Bolet orangé <i>Leccinum aurantiacum</i></p>  
	<p>Sous les épinettes et les pins, principalement dans la forêt boréale. Chapeau rouge brique à marge appendiculée. Les rugosités noires apparaissent au milieu du pied dès le jeune âge pour s'étendre vers le haut et le bas par la suite. La surface des tubes brunit au froissement. Les six espèces de ce groupe sont mises en marché sous un seul nom: B. orangé ou B. des épinettes.</p>	<p>5.22 Bolet des épinettes <i>Leccinum piceinum</i></p>  
	<p>C'est le seul bolet à avoir d'abondantes rugosités noires à la longueur du pied, jusque sous les tubes. Chapeau rouge brique à marge appendiculée. La surface grisâtre de tubes est immuable ou brunit au froissement. Le pied s'élargit vers le bas. La chair devient gris pourpré ou noirâtre à la coupe. On le rencontre principalement en compagnie des bouleaux, dans la forêt boréale.</p>	<p>5.23 Bolet à pied noir <i>Leccinum atrostopitatum</i></p>  
	<p>Chapeau rouge brique en jeune âge devenant brun à brun pâle à maturité. Marge du chapeau appendiculée. Surface des tubes blanchâtre au début pour devenir jaunâtre puis brunâtre avec l'âge, immuable ou brunissant au froissement. Pied faiblement rugueux, s'élargissant vers le bas. Sous les peupliers (peuplier à grandes dents), plus rarement sous les bouleaux.</p>	<p>5.24 Bolet insigne <i>Leccinum insigne</i></p>  
	<p>Chapeau entièrement brun à brun grisâtre à marge appendiculée, sans teintes d'orangé ou de rouge brique. Surface des tubes blanchâtre, devenant olivacée avec l'âge et brunissant au froissement. Pied s'élargissant vers le bas. Se rencontre principalement sous les peupliers et les bouleaux.</p>	<p>5.25 Bolet insolite <i>Leccinum insolens</i></p>  
	<p>Dans ce groupe, c'est le seul bolet à avoir une marge unie, lisse, non appendiculée. Son chapeau est gris-brun foncé. La surface grisâtre des tubes brunit au froissement ou avec l'âge. Le pied est souvent courbé à la base. On le rencontre principalement sous les peupliers faux-tremble.</p>	<p>5.26 Bolet gris-noir <i>Leccinum griseonigrum</i></p>  

SOUS-GROUPE 5 D: PIED RUGUEUX, VERS LE GRIS-VIOLET, NOMS DES ESPÈCES

5 D Chapeau lisse, chair changeant de couleur vers le gris violet.

Chapeau jaune à orangé, parfois vers le rouge brique.

Chapeau rouge brique plus pâle avec l'âge.

Pied entièrement couvert de rugosités noires, même en jeune âge.

Chapeau dans diverses teintes de rouge brique à brun orangé.

Chapeau brun à brun grisâtre et absence de teintes orangées ou rougeâtres.

Chapeau brun-gris foncé palissant avec l'âge; marge lisse, non appendiculée.

<p>Noms de commerce: Bolet orangé, B. des épinettes, Orange Bolete, Spruce B. Noms français: Bolet orangé, Bolet orangé des chênes, Bolet rude orange... Nom anglais: Orange-capped Bolete Noms latins: <i>Leccinum aurantiacum</i>, <i>Leccinum vulpinum</i>, <i>Leccinum quercinum</i>, <i>Leccinum albstipitatum</i>.</p>	<p>5.21 Bolet orangé <i>Leccinum aurantiacum</i></p>
<p>Noms de commerce: Bolet orangé, B. des épinettes, Orange Bolete, Spruce B. Noms français: Bolet des épinettes, Bolet de l'épicea, Bolet rude des épiceas Nom anglais: Spruce Bolete Noms latins: <i>Leccinum piceinum</i>, <i>Krombholziella piceina</i>, <i>Boletus piceinus</i></p>	<p>5.22 Bolet des épinettes <i>Leccinum piceinum</i></p>
<p>Noms de commerce: Bolet orangé, B. des épinettes, Orange Bolete, Spruce B. Nom français: Bolet à pied noir Noms anglais: Black-stemmed Bolete, Dark-stalked Bolete Noms latins: <i>Leccinum atrostopitatum</i>, <i>Leccinum versipelle</i>, <i>Leccinum testaceoscabrum</i></p>	<p>5.23 Bolet à pied noir <i>Leccinum atrostopitatum</i></p>
<p>Noms de commerce: Bolet orangé, B. des épinettes, Orange Bolete, Spruce B. Nom français: Bolet insigne Noms anglais: Conspicuous Bolete, Aspen Bolete, Aspen Scaber Stalk Noms latins: <i>Leccinum insigne</i>, <i>Krombholziella insignis</i></p>	<p>5.24 Bolet insigne <i>Leccinum insigne</i></p>
<p>Noms de commerce: Bolet orangé, B. des épinettes, Orange Bolete, Spruce B. Nom français: Bolet insolite Nom anglais: Unusual Bolete Nom latin: <i>Leccinum insolens</i></p>	<p>5.25 Bolet insolite <i>Leccinum insolens</i></p>
<p>Noms de commerce: Bolet orangé, B. des épinettes, Orange Bolete, Spruce B. Nom français: Bolet gris-noir Nom anglais: Nom latin: <i>Leccinum griseonigrum</i></p>	<p>5.26 Bolet gris-noir <i>Leccinum griseonigrum</i></p>