


GROUPE 6 C Changement partiel de couleur vers le rose, le rouge ou le brun.











GROUPE 6 C Changement partiel de couleur vers le rose, le rouge ou le brun.




Chapeau brun à brun olive, craquelé avec l'âge, chair jaunâtre dans les craquelures, à marge parfois lobée à irrégulière à maturité. Pied blanchâtre à jaunâtre ou rougeâtre, fortement réticulé dans la partie supérieure ou à la longueur. Surface des tubes jaune au début, olivacée par la suite, immuable ou changeant de couleur au froissement; pores grands, ronds à anguleux. Chair blanche ou jaune pâle, immuable ou devenant rougeâtre violacée à la coupe, parfois jaunissant ou bleuissant au-dessus des tubes.				6.40 Bolet tenace Xerocomus ten	** ** ** **
Chapeau brun velouté en jeune âge, brun pâle à maturité, à marge unie. Pied typiquement réticulé à l'apex blanc en jeune âge, brun pâle à maturité. Surface des tubes de blanchâtre à rosâtre puis rose-brun, brunissant au froissement, à pores anguleux. Chair blanchâtre, devenant rosâtre ou brunâtre par endroits à la coupe.			6.41 Bolet indécis Tylopilus indeci	isus	




Fructifications trapues au pied large et à chair ferme. Chapeau brun, gris à violacé, parfois teinté de rougeâtre. Pied rétréci à la base, recouvert de minuscules écailles brun pourpré ou brun-gris sur toute la longueur. Surface des tubes brun foncé au début, plus pâle par la suite, immuable ou brunissant au froissement. Chair gris violacé, gris-brun à la coupe.	6.42 Bolet distingué Tylopilus eximius Sutorius eximius
Chapeau brun noirâtre, plus pâle à maturité. Pied brun pâle, souvent strié. Surface des tubes grisâtre, plus foncée à maturité, bleuissant au froissement. Chair blanche, rougissant ou bleuissant par endroits à la coupe, surtout audessus des tubes.	6.43 Bolet porphyre Porphyrellus porphyrosporus
Souvent sur des souches ou des troncs pourris au sol. Pied de la même couleur que le chapeau: brun foncé à rouge brun, parfois teinté d'olivâtre à maturité. Surface des tubes jaunâtre, olivacée à maturité, bleuissant au froissement; pores ronds à anguleux. Chair blanche immuable, parfois rougissant ou bleuissant un peu à la coupe.	6.44 Bolet bai, Xerocomus badius Imleria badia
De petite taille et sombre sur toutes ses parties, peu visible en automne à les feuilles mortes. Chapeau brun pâlissant avec l'âge et souvent craquelé à maturité. Pied brunâtre avec des stries longitudinales plus foncées. Surface des tubes blanchâtre, brunissant à maturité, bleuissant au froissement. Chair blanchâtre devenant rouge brun à la coupe	6.45 Bolet à pied fumé Porphyrellus fumosipes Tylopilus sordidus
Chapeau jaune brun plus pâle vers la marge, parfois foncé sur toute la surface. Pied concolore au chapeau ou plus pâle, parfois finement réticulé. Surface des tubes blanchâtre, rosâtre à maturité, brunissant au froissement. Chair blanche à jaune pâle brunissant à la coupe.	6.46 Bolet des Appalaches Tylopilus appalachiensis
Chapeau blanchâtre au début développant des teintes rosâtres ou brunâtres à maturité; surface souvent plissée. Pied blanchâtre, parfois faiblement réticulé. Surface des tubes blanche, rosâtre à maturité, brunissant au froissement. Chair blanche, brunissant lentement à la coupe.	6.47 Bolet mitoyen Tylopilus intermedius

GROUPE 6 C Changement partiel de couleur vers le rose, le rouge ou le brun.



Nom français: Bolet tenace Nom anglais: Xerocomus tenax Noms latins: Xerocomus tenax, Boletus tenax				6.40 Bolet tenace <i>Xerocomus tenax</i>
Nom français: Bolet ind Nom anglais: Tylopilus i Nom latin: <i>Tylopilus ind</i>	indecisus			6.41 Bolet indécis Tylopilus indecisus



Noms français: Bolet distingué, Bolet singulier Noms anglais: Lilac-brown Bolete Noms latins: Sutorius eximius, Tylopilus eximius, Leccinum eximium	6.42 Bolet distingué Tylopilus eximius Sutorius eximius
Noms français: Bolet porphyre Noms anglais: Noms latins: <i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	6.43 Bolet porphyre Porphyrellus porphyrosporus
Nom français: Bolet bai Nom anglais: Bai Bolete Noms latins: <i>Xerocomus badius, Imleria badia, Boletus badius, Suillus Badius, Boletus</i> <i>stejskalii, Gyrodon stejskalii, Suillus vaccines, Ixocomus badius</i>	6.44 Bolet bai, Xerocomus badius Imleria badia
Noms français: Bolet à pied fumé, Bolet à pied sombre Nom anglais: Noms latins: Porphyrellus fumosipes, Tylopilus sordidus, Boletus sordidus, Porphyrellus sordidus, Ceriomyces sordidus, Tylopilus porphyrosporus	6.45 Bolet à pied fumé Porphyrellus fumosipes Tylopilus sordidus
Nom français: Bolet des Appalaches Nom anglais: Nom latin: <i>Tylopilus appalachiensis</i>	6.46 Bolet des Appalaches Tylopilus appalachiensis
Nom français: Bolet mitoyen Nom anglais: Bitter Parchment Bolete Nom latin: <i>Tylopilus intermedius</i>	6.47 Bolet mitoyen Tylopilus intermedius