

# CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 7 CHAIR BLANCHE IMMUABLE

GROUPE 7 B  
PIED NON RÉTICULÉ

7 B-1 Chapeau gris ou dans diverses teintes de brun.
























7 B-2 Chapeau dans diverses teintes de beige jaunâtre ou de bleu violacé.

Chapeau gris ou plus ou moins brunâtre avec des tons rosés en jeune âge.

Chapeau brun souvent avec de petites taches jaunes ou blanchâtres à maturité.

Chapeau brun marron au début, puis pourpré à rougeâtre foncé; pied entièrement brun ou brunâtre.

Chapeau brun un peu rougeâtre, profil très élancé.

				<p>7.11 Bolet pâle <i>Boletus pallidus</i></p>  
				<p>7.12 Bolet affine <i>Xanthoconium affine</i></p>  
		<p>Surface des tubes longtemps blanche puis blanc sombre à brunâtre.</p>		<p>7.13 Bolet à tête bai <i>Tylophilus badiceps</i></p>  
				<p>7.14 Bolet grêle <i>Astroboletus gracilis</i></p>  

## CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 7 CHAIR BLANCHE IMMuable











GROUPE 7 B  
PIED NON RÉTICULÉ

7 B-2 Chapeau dans  
diverses teintes de beige  
jaunâtre ou de bleu  
violacé.

Chapeau beige ou jaune  
brunâtre pâle, pied  
blanchâtre.

Chapeau brun violet à  
pourpré, à rougeâtre,  
brun pâle avec l'âge;  
pied devenant brun olive  
au froissement.

Chapeau pourpre foncé  
devenant brun puis bei-  
ge avec l'âge; pied dans  
les mêmes couleurs mais  
parfois plus pâle.

<p>Port élargi des fructifications; se rencontre dans les vieilles forêts de feuillus.</p>	<p>Pied blanchâtre légèrement strié.</p>	<p>Surface des tubes beige rosé puis brun rougeâtre pâle à maturité.</p>	<p>Chair blanche immuable à la coupe</p>	<p>7.15 Bolet pseudo-pallidus <i>Tylopilus pseudopallidus</i></p>  
				<p>7.16 Bolet rouge-brun <i>Tylopilus rubrobrunneus</i></p>  
		<p>Surface des tubes blanchâtre, devenant rosâtre à maturité.</p>	<p>Chair blanche immuable à la coupe.</p>	<p>7.17 Bolet violet plombé <i>Tylopilus plumbviolaceus</i></p>  

## CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 7 CHAIR BLANCHE IMMUABLE

GROUPE 7 B  
PIED NON RÉTICULÉ

7 B-1 Chapeau gris ou dans diverses teintes de brun.





7 B-2 Chapeau dans diverses teintes de beige jaunâtre ou de bleu violacé.

Chapeau gris ou plus ou moins brunâtre avec des tons rosés en jeune âge.

Chapeau brun souvent avec de petites taches jaunes ou blanchâtres à maturité.

Chapeau brun marron au début, puis pourpré à rougeâtre foncé; pied entièrement brun ou brunâtre.

Chapeau brun un peu rougeâtre, profil très élancé.

	<p>Sous les feuillus à bois dur. Chapeau pâle allant de crème grisâtre à brunâtre, parfois teinté de rose à maturité. Pied généralement blanc et lisse, mais parfois couvert de fines stries s'apparentant à un réticulum. Surface des tubes blanchâtre devenant jaune olivacé avec l'âge, bleuisant ou brunissant au froissement, mais parfois immuable; pores ronds à irréguliers. Chair blanche à jaune pâle, immuable, parfois bleuisant légèrement à la coupe.</p>	<p>7.11 Bolet pâle <i>Boletus pallidus</i></p> 
	<p>Chapeau brun, finement velouté, avec de petites taches blanches ou jaunâtres à maturité. Pied blanchâtre en jeune âge, brun à maturité, strié de brun ou de rougeâtre. Surface des tubes blanche au début, devenant jaune brunâtre à maturité; pores ronds à irréguliers. Chair blanche, immuable, parfois prenant lentement des teintes jaunâtres.</p>	<p>7.12 Bolet affine <i>Xanthoconium affine</i></p> 
	<p>Chapeau brun marron au début, par la suite brun pourpré à rouge-brun foncé. Pied de la même couleur que le chapeau, souvent blanc à l'apex et à la base, parfois courtement réticulé à l'apex. Surface des tubes blanche, vers le brun à maturité, brunissant au froissement; pores ronds à anguleux. Chair blanche immuable, parfois lentement vers le brun ou le rosâtre à la coupe.</p>	<p>7.13 Bolet à tête bai <i>Tylopilus badiceps</i></p> 
	<p>Fructifications au port élancé. Chapeau brun à rougeâtre, finement craquelé à maturité. Pied de la même couleur que le chapeau ou plus pâle, blanchâtre à la base, strié ou un peu côtelé à maturité. Surface des tubes blanche, rosâtre à brunâtre à maturité; pores ronds à irréguliers. Chair blanche ou rose pâle, immuable.</p>	<p>7.14 Bolet grêle <i>Austroboletus gracilis</i></p> 

## CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 7 CHAIR BLANCHE IMMuable







GROUPE 7 B  
PIED NON RÉTICULÉ

7 B-2 Chapeau dans  
diverses teintes de beige  
jaunâtre ou de bleu  
violacé.

Chapeau beige ou jaune  
brunâtre pâle, pied  
blanchâtre.

Chapeau brun violet à  
pourpré, à rougeâtre,  
brun pâle avec l'âge;  
pied devenant brun olive  
au froissement.

Chapeau pourpre foncé  
devenant brun puis be-  
ige avec l'âge; pied dans  
les mêmes couleurs mais  
parfois plus pâle.

<p>Sous les arbres feuillus. Chapeau beige à jaune brunâtre pâle, à marge unie. Pied égal, blanchâtre, finement strié. Surface des tubes rosée, puis brun rougeâtre pâle immuable ou brunissant lentement au froissement ; pores petits et ronds. Chair blanche immuable.</p>	<p>7.15 Bolet pseudo-pallidus <i>Tylophilus pseudopallidus</i></p>  
<p>Sous les feuillus à bois dur et les pruches. Chapeau violet pâle en jeune âge devenant brun-violet à brun pourpré avec l'âge, à marge unie. pied blanchâtre à brunâtre, parfois finement réticulé à l'apex et se tachant parfois de brun olive au froissement. Surface des tubes brunâtre au début puis blanchâtre à rosâtre, brunissant au froissement; pores ronds. Chair blanche, immuable à saveur très amère.</p>	<p>7.16 Bolet rouge-brun <i>Tylophilus rubrobrunneus</i></p>  
<p>Sous les feuillus à bois dur, tout particulièrement les chênes. Chapeau violet ou pourpre au début, pâlisant à beige à maturité, à marge unie. Pied violet ou pourpre, parfois marbré de blanc, parfois légèrement réticulé à l'apex. Surface des tubes blanche au début devenant rosâtre ou beige à maturité, immuable; pores ronds. Chair blanche immuable.</p>	<p>7.17 Bolet violet plombé <i>Tylophilus plumbviolaceus</i></p>  

## BOLETS DU GROUPE 7 B: NOMS DES ESPÈCES.

GROUPE 7 B  
PIED NON RÉTICULÉ

7 B-1 Chapeau gris ou dans diverses teintes de brun.

7 B-2 Chapeau dans diverses teintes de beige jaunâtre ou de bleu violacé.

Chapeau gris ou plus ou moins brunâtre avec des tons rosés en jeune âge.

Chapeau brun souvent avec de petites taches jaunes ou blanchâtres à maturité .

Chapeau brun marron au début, puis pourpré à rougeâtre foncé; pied entièrement brun ou brunâtre.

Chapeau brun un peu rougeâtre, profil très élancé.

<p>Nom français: Bolet pâle Nom anglais: Pallid Bolete Noms latins: <i>Boletus pallidus</i>, <i>Ceratomyces pallidus</i>, <i>Suillus pallidus</i>, <i>Imleria pallida</i></p>	<p>7.11 Bolet pâle <i>Boletus pallidus</i></p>
<p>Nom français: Bolet affine Nom anglais: Spotted Bolete Noms latins: <i>Xanthoconium affine</i>, <i>Boletus affinis</i>, <i>Xanthoconium affine var. reticulatum</i></p>	<p>7.12 Bolet affine <i>Xanthoconium affine</i></p>
<p>Nom français: Bolet à tête bai Nom anglais: Beveled-cap Bolete Noms latins: <i>Tylopilus badiceps</i>, <i>Boletus badiceps</i></p>	<p>7.13 Bolet à tête bai <i>Tylopilus badiceps</i></p>
<p>Noms français: Bolet grêle Nom anglais: Graceful Bolete Noms latins: <i>Austroboletus gracilis</i>, <i>Boletus gracilis</i>, <i>Tylopilus gracilis</i>, <i>Suillus gracilis</i>, <i>Porphyrellus gracilis</i></p>	<p>7.14 Bolet grêle <i>Austroboletus gracilis</i></p>

## BOLETS DU GROUPE 7 B: NOMS DES ESPÈCES.

### GROUPE 7 B PIED NON RÉTICULÉ

7 B-2 Chapeau dans  
diverses teintes de beige  
jaunâtre ou de bleu  
violacé.

Chapeau beige ou jaune  
brunâtre pâle, pied  
blanchâtre.

Chapeau brun violet à  
pourpré, à rougeâtre,  
brun pâle avec l'âge;  
pied devenant brun olive  
au froissement.

Chapeau pourpre foncé  
devenant brun puis  
beige avec l'âge; pied  
dans les mêmes couleurs  
mais parfois plus pâle.

<p>Nom français: Bolet pseudo-pallidus Nom anglais: Nom latin: <i>Tylopilus pseudopallidus</i></p>	<p>7.15 Bolet pseudo-pallidus <i>Tylopilus pseudopallidus</i></p>
<p>Noms français: Bolet rouge-brun, Bolet brun roux Noms anglais: Red-brownish Bolete, Reddish Brown Bitter Bolete Nom latins: <i>Tylopilus rubrobrunneus</i></p>	<p>7.16 Bolet rouge-brun <i>Tylopilus rubrobrunneus</i></p>
<p>Nom français: Bolet violet plombé Nom anglais: Violet-grey Bolete Nom latin: <i>Tylopilus plumboviolaceus</i></p>	<p>7.17 Bolet violet plombé <i>Tylopilus plumboviolaceus</i></p>