

## POLYPORES SUR DES BRANCHES OU SUR DES TRONCS

## 4a PIED CENTRAL AU LATÉRAL PRÉSENT

### 4.a Pores plus petits.


Entièrement blanc en jeune âge; chapeau gris à brunâtre avec l'âge; pores visibles, 2 à 5 par mm, entiers et anguleux au début, mais lacérés par la suite; pied souvent court, centré à latéral, blanc au début, gris à brunâtre avec l'âge. Taille petite à moyenne.

→ 4a-16 Polypore osseux




Chapeau brun grisâtre à presque noir; marge souvent ciliée à frangée, concolore au reste du chapeau; pores ronds, visibles, 2 à 4 par mm, blancs à ivoire, parois minces devenant lacérées avec l'âge; pied centré à excentré, grisâtre à brunâtre. Taille très petite à moyenne.

→ 4a-17 Polypore d'hiver



Chapeau brun pâle à grisâtre, lisse à finement écailleux; marge ciliée au début, glabre avec l'âge; pores non visibles, 5 à 7 par mm, crème pâle à tan; pied centré, chiné, ochracé pâle à brunâtre sombre. Taille petite à moyenne.

→ 4a-18 Polypore cilié



Chapeau crème à brun pâle, glabre ou garni de fines écailles brunes; marge concolore à la surface du chapeau; pores anguleux, bien visibles, 1 à 3 par mm; pied centré à excentré, brun pâle, garni d'hyphes à la base. Taille petite à moyenne.

→ 4a-19 Polypore du hêtre



Fructifications en forme de coupes; chapeau blanc à chamois, zoné concentriquement de brun grisâtre; pores anguleux, visibles, 2 à 4 par mm; pied rudimentaire ou absent. Taille très petite à petite.

→ 4a-20 Tramète coupelle



Chiné: garni de fibrilles ou petites écailles formant un dessin coloré en zig-zag ou d'une autre forme sur le pied.