# CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 8
# CHAIR COLORÉE IMMUABLE

**8 A Fructifications de petite taille, le groupe du bolet poivré.**

- **Chair rougeâtre au-dessus des tubes.**
- **Chair violacée au-dessus des tubes.**
- **Fructifications rouge pourpré en jeune âge, brunâtres à maturité.**

**8.1**
**Bolet poivré**
***Chalciporus piperatus***

**8.2**
**Bolet faux-poivré**
***Chalciporus piperatoides***

**8.3**
**Bolet rubigineux**
***Chalciporus rubinellus***

# CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 8
## CHAIR COLORÉE IMMUABLE

8 B Fructifications moyennes à grandes; pied non réticulé.

8 B La suite.
8 C Fructifications moyennes à grandes; pied réticulé.

- Chapeau brun à brun jaunâtre; pied jaune pâle marqué le lignes rougeâtres avec l'âge.
- Chapeau brun olive, brun rougeâtre avec l'âge; pied jaunâtre à rouge brunâtre
- Chapeau brun à brun rougeâtre; pied de la même couleur que le chapeau.
- Chapeau brun , brun rougeâtre à rouge vin; pied ± de la même couleur.
- Chapeau brun-jaune à brun rougeâtre profondément plissé-alvéolé;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **8.4**<br>**Bolet glabrescent**<br>***Boletus subglabripes*** |
| | |  | | **8.5**<br>**Bolet subtomenteux**<br>***Xerocomus subtomentosus*** |
| | | | | **8.6**<br>**Bolet bai**<br>***Xerocomus badius***<br>***Imleria badia*** |
| | **Pied ± de la même couleur que le chapeau, bulbeux, appointi à la base.** | **Surface des tubes jaune doré puis jaune brunâtre à maturité ou au froissement.** | **Chair blanchâtre à jaunâtre dans le chapeau, brunâtre dans le pied.** | **8.7**<br>**Bolet incliné**<br>***Aureoboletus innixus*** |
| | | | | **8.8**<br>**Bolet de Horton**<br>***Boletus hortonii*** |

# CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 8 CHAIR COLORÉE IMMUABLE

**8 B Pied non réticulé, la suite** → **Pied jaune orangé, strié, élargi vers le bas à clavé.**

**8 C Fructifications moyennes à grandes, pied réticulé.**

- **Réticulations jaunes proéminentes; tout est teinté de jaune.**
- **Réticulations grises moins marquées que le bolet à pied orné.**
- **Côtelé dans le haut du pied formant un réticulum partiel; chapeau orange rosé à orange brunâtre.**
- **Pied finement réticulé de jaune vers l'apex.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Chapeau dans divers tons d'orange brun. | Pied jaune orangé, strié, élargi vers le bas à clavé. | Surface des tubes blanchâtre à olive-grisâtre, jaune olivacé avec l'âge. | Chair blanchâtre à jaunâtre, immuable à la coupe. | 8.9<br>Bolet de Roxane<br>*Aureoboletus roxanae*<br>*Xerocomus roxanae* |
| | | |  | | 8.10<br>Bolet à pied orné<br>*Retiboletus ornatipes*<br>*Boletus ornatipes* |
| | Brunissant avec l'âge.<br> | |  | | 8.11<br>Bolet gris<br>*Retiboletus griseus*<br>*Boletus griseus* |
| | | | | | 8.12<br>Bolet trompeur<br>*Xerocomus illudens*<br>*Boletus illudens* |
| | | | Surface des tubes jaune pâle, jaune olive à maturité. | | 8.13<br>Bolet à pied doré<br>*Boletus auripes*<br>*Boletus aureissimus* |

# CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 8
# CHAIR COLORÉE IMMUABLE

**8 A Fructifications de petite taille, le groupe du bolet poivré.**

- **Chair rougeâtre au-dessus des tubes.**
- **Chair violacée au-dessus des tubes.**
- **Fructifications rouge pourpré en jeune âge, brunâtres à maturité.**

| | | |
|---|---|---|
| | **Un petit bolet, fréquent mais jamais très nombreux, fructifiant tout au long de la saison. On le reconnait à son chapeau brun, son pied jaunâtre, ses tubes brunâtres aux pores grands, à sa chair jaune dans le pied et souvent rougeâtre au-dessus des tubes et sa saveur légèrement poivrée.**<br>**Déchydraté et mis en poudre, on l'utilise comme condiment.** | **8.1**<br>**Bolet poivré**<br>***Chalciporus piperatus*** |
| | **Ce très rare bolet se reconnait à son chapeau brun à brun rougeâtre, son pied coloré de rouge brun comme le chapeau ou plus pâle, à la surface brun rouille de ses tubes aux pores larges et tout particulièrement à la couleur violacée de sa chair au-dessus des tubes.** | **8.2**<br>**Bolet faux-poivré**<br>***Chalciporus piperatoides*** |
| | **De taille petite à moyenne, le bolet rubigineux s'illustre par ses couleurs rouge pourpré en jeune âge qui s'atténuent vers le brun pâle avec l'âge.**<br>**C'est surement l'un des plus beaux bolets que l'on puisse rencontrer.** | **8.3**<br>**Bolet rubigineux**<br>***Chalciporus rubinellus*** |

## CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 8
## CHAIR COLORÉE IMMUABLE

**8 B Fructifications moyennes à grandes; pied non réticulé.**

**8 B La suite.**
**8 C Fructifications moyennes à grandes; pied réticulé.**

| | | |
|---|---|---|
| **Chapeau brun à brun jaunâtre; pied jaune pâle marqué le lignes rou-geâtres avec l'âge.** | **Chapeau brun pâlissant avec l'âge. Tubes, pied et chair jaunâtres. Surface des tubes immuable, pores petits et ronds.**<br>**À maturité (ou plus tard) des lignes rougeâtres apparaissent sur le pied et des taches bleu verdâtres à la surface des tubes.**<br>**Après le cèpe d'Amérique, c'est le meilleur bolet qui puisse être mis en marché; sa chair ne change de couleur et ne réduit pas à la cuisson.** | **8.4**<br>**Bolet glabrescent**<br>***Boletus subglabripes*** |
| **Chapeau brun olive, brun rougeâtre avec l'âge; pied jaunâtre à rouge brunâtre** | **Chapeau brun teinté de vert olive au début, puis jaunâtre avec l'âge, souvent craquelé à maturité. Pied marqué de lignes côtelées à l'apex, mais non réticulé, ponctué de brun sur fond jaunâtre.**<br>**Surface des tubes jaune au début, olivacée à maturité, immuable ou bleuissant faiblement au froissement. Pores des tubes larges et anguleux.**<br>**Chair blanchâtre dans le chapeau, jaunâtre dans le pied, immuable, parfois bleuissant ou jaunissant faiblement à la coupe.** | **8.5**<br>**Bolet subtomenteux**<br>***Xerocomus subtomentosus*** |
| **Chapeau brun à brun rougeâtre; pied de la même couleur que le chapeau.** | **Souvent sur des souches ou des troncs pourris au sol. Pied de la même couleur que le chapeau: brun foncé à rouge brun, parfois teinté d'olivâtre à maturité.**<br>**Surface des tubes jaunâtre, olivacée à maturité, bleuissant au froissement; pores ronds à anguleux.**<br>**Chair blanche immuable, parfois rougissant ou bleuissant un peu à la coupe.** | **8.6**<br>**Bolet bai**<br>***Xerocomus badius***<br>***Imleria badia*** |
| **Chapeau brun , brun rougeâtre à rouge vin; pied ± de la même couleur.** | **Très variable dans son apparence. Chapeau brun pâle, brun jaune à brun olivacé. Pied jaunâtre marqué de lignes brunâtres. Surface des tubes jaune, pâlissant avec l'âge; pores circulaires à anguleux, très larges à maturité.**<br>**Chair blanche à jaune pâle, rougeâtre sous la cuticule, brunâtre dans le pied.** | **8.7**<br>**Bolet incliné**<br>***Aureoboletus innixus*** |
| **Chapeau brun-jaune à brun rougeâtre profondément plissé-alvéolé;** | **Chapeau profondément plissé dans divers tons de brun jaune.**<br>**Pied jaune pâle à brun pâle, parfois avec des teintes rougeâtres vers le bas.**<br>**Surface des tubes jaune en jeune âge, olivâtre par la suite, parfois bleuissant lentement au froissement; pores ronds à anguleux.**<br>**Chair blanche, immuable, parfois bleuissant faiblement à la coupe** | **8.8**<br>**Bolet de Horton**<br>***Boletus hortonii*** |

## CLEF D'IDENTIFICATION DES BOLETS DU GROUPE 8 CHAIR COLORÉE IMMUABLE

**8 B Pied non réticulé, la suite** → **Pied jaune orangé, strié, élargi vers le bas à clavé.**

**8 C Fructifications moyennes à grandes, pied réticulé.**

- → **Réticulations jaunes proéminentes; tout est teinté de jaune.**
- → **Réticulations grises moins marquées que le bolet à pied orné.**
- → **Côtelé dans le haut du pied formant un réticulum partiel; chapeau orange rosé à orange brunâtre.**
- → **Pied finement réticulé de jaune vers l'apex.**

| | | |
|---|---|---|
| | **Chapeau jaune brun à rouille en jeune âge, jaune-orangé à maturité, plus pâle vers la marge. Pied strié longitudinalement, du moins dans la partie supérieure, jaune orangé à brun pâle avec une zone plus pâle à l'apex.<br>Surface des tubes blanchâtre au début, jaune pâle à jaune foncé à maturité.<br>Chair blanchâtre à jaune pâle, immuable.** | **8.9<br>Bolet de Roxane<br>*Aureoboletus roxanae*<br>*Xerocomus roxanae*** |
| | **Tout est teinté de jaune chez ce bolet avec un chapeau allant de jaune à brun foncé ou à brun verdâtre. Pied jaune, fortement réticulé sur toute sa longueur et ce réticulum est de couleur jaune. La surface des tubes est jaune en jeune âge devenant jaune brunâtre avec l'âge et immuable; pores ronds à anguleux.<br>Chair jaunâtre, immuable. (Certains spécimens peuvent avoir un pied rouge).** | **8.10<br>Bolet à pied orné<br>*Retiboletus ornatipes*<br>*Boletus ornatipes*** |
| | **Ce bolet est beaucoup plus rare que le bolet à pied orné. Chapeau gris à gris brun, développant des teintes jaunâtres à brunâtres avec l'âge; souvent écailleux à maturité. Pied orné de réticulations proéminentes grises au début, développant des teintes jaunes ou rougeâtres avec l'âge. Surface des tubes blanchâtre à gris-brun, immuable ou brunissant au froissement.<br>Chair jaunâtre, plus foncée dans le pied, immuable.** | **8.11<br>Bolet gris<br>*Retiboletus griseus*<br>*Boletus griseus*** |
| | **Chapeau dans divers tons d'orange au début, orange brunâtre à maturité.<br>Pied égal ou atténué vers le bas, côtelé, du moins dans la partie supérieure, et dont les lignes forment un réticulum partiel. Surface des tubes jaune, immuable ou parfois brunissant ou bleuissant au froissement; pores larges et anguleux.<br>Chair blanchâtre à jaune pâle, immuable ou parfois devenant légèrement rougeâtre dans le pied.** | **8.12<br>Bolet trompeur<br>*Xerocomus illudens*<br>*Boletus illudens*** |
| | **Couleur du chapeau allant de jaune à brun foncé.<br>Pied jaunâtre avec de fines réticulations jaunes.<br>Surface des tubes jaune au début, jaune olivacée à maturité, immuable; pores ronds à anguleux.<br>Chair jaune immuable.** | **8.13<br>Bolet à pied doré<br>*Boletus auripes*<br>*Boletus aureissimus*** |

## GROUPE 8: CHAIR COLORÉE IMMUABLE, NOMS DES ESPÈCES

**8 A Fructifications de petite taille, le groupe du bolet poivré.**

| | | |
|---|---|---|
| **Chair rougeâtre au-dessus des tubes.** | **Nom français: Bolet poivré**<br>**Nom anglais: Peppery Bolete**<br>**Noms latins:** ***Chalciporus piperatus, Boletus piperatus, Ceriomyces piperatus, Ixocomus piperatus, Leccinum piperatum, Suillus piperatus, Viscipellis piperata, Ceriomyces ferruginatus…*** | **8.1**<br>**Bolet poivré**<br>***Chalciporus piperatus*** |
| **Chair violacée au-dessus des tubes.** | **Nom français: Bolet faux-poivré**<br>**Nom anglais:**<br>**Noms latins:** ***Chalciporus piperatoides, Boletus piperatoides*** | **8.2**<br>**Bolet faux-poivré**<br>***Chalciporus piperatoides*** |
| **Fructifications rouge pourpré en jeune âge, brunâtres à maturité.** | **Noms français: Bolet rubigineux**<br>**Nom anglais: Purple Bolete**<br>**Noms latins:** ***Chalciporus rubinellus, Boletus rubinellus, Suillus rubinellus, Tubiporus rubinellus, Boletus pseudorubinellus…*** | **8.3**<br>**Bolet rubigineux**<br>***Chalciporus rubinellus*** |

## GROUPE 8: CHAIR COLORÉE IMMUABLE. NOMS DES ESPÈCES.

**8 B Fructifications moyennes à grandes; pied non réticulé.**

**8 B La suite.**
**8 C Fructifications moyennes à grandes; pied réticulé.**

| | | |
|---|---|---|
| **Chapeau brun à brun jaunâtre; pied jaune pâle marqué le lignes rou-geâtres avec l'âge.** | **Noms de commerce; Bolet doré, Bolet glabrescent, Golden Bolete**<br>**Nom français: Bolet à pied glabrescent, Bolet glabrescent**<br>**Nom anglais: Glabrescent Bolete, Smoothish-stemmed Bolete**<br>**Noms latins:** ***Boletus subglabripes, Hemileccinum subglabripes, Boletus flavipes, Boletus subscabripes, Ceriomyces subglabripes, Krombholziz subglabripes, leccinum subglabripes…*** | **8.4**<br>**Bolet glabrescent**<br>***Boletus subglabripes*** |
| **Chapeau brun olive, brun rougeâtre avec l'âge; pied jaunâtre à rouge brunâtre** | **Noms français: Bolet subtomenteux, Bolet couleur de datte**<br>**Nom anglais: Yellow-craked Bolete**<br>**Noms latins:** ***Xerocomus subtomentosus, Xerocomus spadiceus, Xerocomus ferrugineus, Xerocomus spadiceus…*** | **8.5**<br>**Bolet subtomenteux**<br>***Xerocomus subtomentosus*** |
| **Chapeau brun à brun rougeâtre; pied de la même couleur que le chapeau.** | **Nom français: Bolet bai**<br>**Noms anglais: Bai Bolete**<br>**Noms latins:** ***Xerocomus badius, Imleria badia, Boletus badius, Suillus Badius, Boletus stejskalii, Gyrodon stejskalii, Suillus vaccines, Ixocomus badius…*** | **8.6**<br>**Bolet bai**<br>***Xerocomus badius***<br>***Imleria badia*** |
| **Chapeau brun , brun rougeâtre à rouge vin; pied ± de la même couleur.** | **Nom français: Bolet incliné**<br>**Nom anglais: Clustered Brown Bolete**<br>**Noms latins:** ***Aureoboletus innixus, Aureoboletus caespitosus, Boletus innixius, Pulveroboletus innixius, Boletus caespitosus, Pulveroboletus cespitosus, Boletus auriporus, Boletus viridiflavus…*** | **8.7**<br>**Bolet incliné**<br>***Aureoboletus innixus*** |
| **Chapeau brun-jaune à brun rougeâtre profondément plissé-alvéolé;** | **Nom français: Bolet de Horton**<br>**Noms anglais: Horton's Bolete, Corrugated Bolete**<br>**Noms latins:** ***Boletus hortonii, Hemileccinum hortonii, Leccinum hortonii, Xerocomus hortonii, Leccinum rugosipes…*** | **8.8**<br>**Bolet de Horton**<br>***Boletus hortonii*** |

## GROUPE 8: CHAIR COLORÉE IMMUABLE, NOMS DES ESPÈCES.

**8 B Pied non réticulé, la suite** → **Pied jaune orangé, strié, élargi vers le bas à clavé.**

**8 C Fructifications moyennes à grandes, pied réticulé.**

- → **Réticulations jaunes proéminentes; tout est teinté de jaune.**
- → **Réticulations grises moins marquées que le bolet à pied orné.**
- → **Côtelé dans le haut du pied formant un réticulum partiel; chapeau orange rosé à orange brunâtre.**
- → **Pied finement réticulé de jaune vers l'apex.**

| | | |
|---|---|---|
| | **Nom français: Bolet de Roxane**<br>**Nom anglais:**<br>**Noms latins:** ***Aureoboletus roxanae, Xerocomus roxanae*** | **8.9**<br>**Bolet de Roxane**<br>***Aureoboletus roxanae***<br>***Xerocomus roxanae*** |
| | **Noms français: Bolet à pied orné, Bolet jaune**<br>**Noms anglais: Ornate-stalked Bolete, Ornate Bolete, Gold Stalk**<br>**Noms latins:** ***Retiboletus ornatipes, Boletus ornatipes*** | **8.10**<br>**Bolet à pied orné**<br>***Retiboletus ornatipes***<br>***Boletus ornatipes*** |
| | **Nom français: Bolet gris**<br>**Nom anglais: Gray Bolete**<br>**Noms latins:** ***Retiboletus griseus, Boletus griseus, Xerocomus griseus, Ceriomyces griseus*** | **8.11**<br>**Bolet gris**<br>***Retiboletus griseus***<br>***Boletus griseus*** |
| | **Nom français: Bolet trompeur**<br>**Nom anglais:**<br>**Noms latins:** ***Xerocomus illudens, Boletus illudens*** | **8.12**<br>**Bolet trompeur**<br>***Xerocomus illudens***<br>***Boletus illudens*** |
| | **Noms français: Bolet à pied doré, Bolet jaune doré, Cèpe doré**<br>**Noms anglais: Butter-foot Bolete, Bright Yellow Bolete, Golden Bolete, Yellow Bolete**<br>**Noms latins:** ***Boletus auripes, Boletus aureissimus, Butyriboletus taughannockensis, Ceriomyces aureissimus*** | **8.13**<br>**Bolet à pied doré**<br>***Boletus auripes***<br>***Boletus aureissimus*** |