

	<b>1.6 Stérée duveteuse</b> <i>Stereum gausapatum</i>	<b>1.7 Stérée pourpre</b> <i>Chondrostereum purpureum</i>	<b>1.8 Stérée entassée</b> <i>Stereum complicatum</i>	<b>1.9 Stérée tomenteuse</b> <i>Stereum subtomentosum</i>	<b>Stérée hirsute</b> <i>Stereum hirsutum</i>	<b>Stérée sanguinolante</b> <i>Stereum sanguinolentum</i>
<b>HABITAT</b>	100% feuillus (chênes).	90% feuillus.	95% feuillus.	100% feuillus.	85% feuillus.	
		10% conifères.	5% conifères.		15% conifères.	100% conifères.
<b>FORME GÉNÉRALE</b>	Étalé ou étalé et réfléchi. Souvent, chapeaux accolés et attachés les uns aux autres.	Étalé et réfléchi, parfois sessile. Souvent en amas imbriqués de 10 à 50 cm de longueur.	Étalé et réfléchi ou chapeaux distincts attachés centralement. Chapeaux petits. <b>Recouverts d'algues vertes avec l'âge.</b>	Chapeaux distincts attachés centralement; plus rarement étalés et réfléchis. <b>Recouverts d'algues vertes avec l'âge.</b>	Étalé et réfléchi; souvent, chapeaux distincts attachés centralement.	Étalé ou étalé et réfléchi. Parfois, chapeaux distincts attachés centralement.
<b>SURFACE DU CHAPEAU</b>	Feutrée à hirsute, brun jaunâtre à brun rouille. Zonée, plus ou moins ondulée.	Crépue ou lobée, glabre à poilue, brun foncé à chamois pâle, à grisâtre.	Poilue, soyeuse; <b>zones plutôt larges</b> , dans différentes teintes de brun (et de gris).	Poilue, veloutée, <b>se tachant de jaune au froissement. Zones étroites</b> grisâtres, jaunâtres, brun rouille.	Feutrée, soyeuse ou poilue à hirsute. Nombreuses zones grises, jaunes et oranges.	Zonée de bandes brunes, beiges ou jaunâtres, peu nombreuses.
<b>MARGE</b>	Ondulée, blanche en croissance, puis ochracée.	Souvent, plus pâle que la surface du chapeau.	Lisse à ondulée, blanche à chamois crème.	Mince, ondulée, lobée.	Ondulée; blanche, puis jaunâtre à jaune.	Étroite, sinueuse, blanchâtre à chamois pâle.
<b>SURFACE FRUCTIFÈRE</b>	Bosselée, chamois rosâtre à brunâtre; <b>secrète un liquide rougeâtre au froissement.</b>	Tuberculée, pourprée à brun violacée.	Zonée, lisse, chamois à orange-brunâtre, légèrement bosselée sur la partie étalée. Parfois rougissant au froissement.	Zonée, lisse à légèrement bosselée. Jaunâtre, chamois rosâtre, ocrée. <b>Deviens instantanément jaune au froissement...</b>	Jaune à brune; lisse à bosselée, <b>souvent tuberculée sur la partie étalée.</b>	Bosselée, brun à jaune-brunâtre, à jaune; <b>secrète un liquide rouge foncé au froissement.</b>
<b>CHAIR</b>	Blanche à brun pâle, avec une étroite ligne brune sous la surface du chapeau.	Brunâtre, avec une ligne centrale foncée visible à la coupe.	Très mince, coriace, blanchâtre à crème.	Beige à ochracé, séparée de la surface du chapeau par une zone brun foncé.	Mince, jaunâtre à ocre; mince couche orangée sous la surface du chapeau.	Beige à ochracé, avec une étroite ligne brune sous la surface du chapeau.

Étalé: en croûte à la surface du tronc, sans former de chapeaux véritables. Étalé et réfléchi: en croûte à la surface du tronc et se redresse pour former un chapeau à angle droit avec celui-ci. Sessile: non en croûte à la surface du tronc et attaché à celui-ci en son centre ou à la largeur du chapeau, pied absent. Tuberculé: garni de bosses allongées.