

GROUPE 2: sans voile secondaire, pied non bulbeux émergeant d'une volve en forme de sac ou de doigt de gant.



Groupe -2A:

Chapeau blanc ou gris, pied émergeant d'une volve blanche à grise.

2 espèces.



				<p>2,1 AMANITE À TÊTE BLANCHE <i>AMANITA ALBODICEPS</i></p> <p> ? </p>
				<p>2,2 AMANITE VAGINÉE <i>AMANITA FUACOZONATA</i></p> <p> </p>

VERSION TEXTE



GROUPE 2: sans voile secondaire, pied non bulbeux émergeant d'une volve en forme de sac ou de doigt de gant.




Groupe -2A:

Chapeau blanc ou gris, pied émergeant d'une volve blanche à grise.

2 espèces.



<p>Cette amanite de taille moyenne se rencontre principalement dans les peupleraies et également dans les forêts mixtes, en été et en début d'automne. Elle se distingue des amanites blanches mortelles par son pied non bulbeux entouré à la base par une volve en forme de sac. Son pied ne porte pas de voile secondaire, son chapeau nu (ou orné de restes vélaires blancs) est jaune ocré au centre, la marge est longuement sillonnée et les lamellules sont tronquées.</p>	<p>2,1 AMANITE À TÊTE BLANCHE <i>AMANITA ALBIDICEPS</i></p> 
<p>Ce nom regroupe possiblement une dizaine d'espèces ou de sous-espèces. Les chapeaux vont de gris très pâle à gris ardoise. Chez certaines variétés, la volve est entièrement blanche, tandis que chez d'autres elle est de couleur gris foncé. La distinction de ces différentes espèces ne pourra se faire que par des tests d'ADN.</p>	<p>2,2 AMANITE VAGINÉE <i>AMANITA FUACOZONATA</i></p> 