


GROUPE 2: sans voile secondaire, pied non bulbeux émergeant d'une volve en forme de sac ou de doigt de gant (suite).



**Groupe-2C:
Chapeau brun plus au moins foncé.
6 espèces.**



VERSION TEXTE














				2,11 Amanite fauve <i>Amanita (ameri)fulva</i>
				2,12 Amanite pseudofulva <i>Amanita pseudofulva</i>
Amanite plutôt petite, au profil élancé.	Chapeau brun à brun noir, nu et à marge longuement striée.	Pied Blanc, égal, lisse à légèrement fibrilleux.	Volve blanche en forme de sac, parfois teinté de rouille.	2,13 Amanite noirâtre <i>Amanita subnigra</i>
				2,14 Amanite versicolore <i>Amanita variicolor</i>
				2,15 Amanite élevée <i>Amanita magna</i>
				2,16 Amanite à pied déguenillé <i>Amanita rhacopus</i>

GROUPE 2: sans voile secondaire, pied non bulbeux émergeant d'une volve en forme de sac ou de doigt de gant (suite).



**Groupe -2C:
Chapeau brun plus au moins foncé.
6 espèces.**



	<p>La plus fréquente des amanites sans voile secondaire. On la rencontre tout au long de la belle saison principalement dans les forêts de conifères, plus rarement sous les bouleaux. Parfois elle fructifie sur des souches ou de vieux troncs au sol. Son chapeau est brun orangé à jaune-brun, nu et sa marge sillonnée. Son pied blanc est parfois teinté d'orangé, et sa volve blanche est tachée de brun rouille.</p>	<p>2,11 Amanite fauve <i>Amanita (ameri)fulva</i></p>  
	<p>Cette amanite se distingue de l'amanite fauve principalement par son habitat sous les feuillus nobles, les chênes et les hêtres. Contrairement à l'amanite fauve, son pied blanc ou teinté de brun est souvent chiné. Sa volve est également tachée de brun rouille.</p>	<p>2,12 Amanite pseudofulva <i>A. pseudofulva</i></p>  
	<p>Cette amanite rare fructifie sous les épinettes, surtout dans les plantations d'épinette blanche. Elle se distingue par son chapeau foncé, brun grisâtre à brun jaunâtre foncé, noirâtre au centre, nu et à marge longuement sillonnée. La couleur des lames va de blanc crème à grisâtre et les lamellules vont de tronquées à sub-tronquées. Son pied est blanc et sa volve blanche est souvent tachée de roux orangé.</p>	<p>2,13 Amanite noirâtre <i>Amanita subnigra</i></p>  
	<p>La bandelette grise à la base du pied est une caractéristique qu'elle partage avec l'amanite déguenillée; on la rencontre principalement dans les sapinières à bouleaux. Son chapeau va de brun orangé à brun noir; il est nu ou orné de flocons vélaire gris ou orangés et sa marge est sillonnée. À maturité, son pied est chiné de fibrilles orangées.</p>	<p>2,14 Amanite versicolore <i>A. variicolor</i></p>  
	<p>Cette amanite de grande taille se distingue par son chapeau brun-gris marqué par des zones plus pâles et plus foncées et dont la marge est striée. Son pied chiné de fibrilles brun-gris émerge d'une volve blanche. Les lames vont de blanches à grisâtres et parfois leur arrête est noirâtre. On peut la rencontrer tout au long de la belle saison en association avec les hêtres.</p>	<p>2,15 Amanite élevée <i>Amanita magna</i></p>  
	<p>Cette amanite se caractérise par son chapeau brun-gris, nu ou orné de flocons gris, à marge sillonnée. Son pied est parfois chiné de fines fibrilles à maturité et orné à la base d'une bandelette grise. Elle fructifie de juillet à septembre dans les forêts feuillues ou mixtes.</p>	<p>2,16 Amanite à pied déguenillé <i>Amanita rhacopus</i></p> 