GROUPE-7 : VOILE SECONDAIRE PRÉSENT, CHAPEAU GRIS À GRIS NOIRÂTRE, À BRUN FONCÉ.
6 espèces.

Pied bulbeux et marginé.
2 espèces

7,2
AMANITE PORPHYRE
AMANITA PORPHYRIA

7.3
AMANITE CITRINE
AMANITA CITRINA

PAGE SUIVANTE

GROUPE-7 : VOILE SECONDAIRE PRÉSENT, CHAPEAU GRIS À GRIS NOIRÂTRE, À BRUN FONCÉ.

SUITE

4 espèces

Pied non bulbeux émergeant d'une volve blanche.

Pied bulbeux, bulbe atténué vers le haut.

VERSION TEXTE

7,6
AMANITE DÉDAIGNÉE
AMANITA SPRETA

7,7
AMANITE LIGNOPHILE
AMANITA LIGNOPHILA

7,8
A. FAUSSE BRUNISSANTE
A. SUBMACULATA

7,9
AMANITE DE MORRIS
AMANITA MORRISII

GROUPE-7 : VOILE SECONDAIRE PRÉSENT, CHAPEAU GRIS À GRIS NOIRÂTRE, À BRUN FONCÉ.
6 espèces

Pied bulbeux et marginé.
2 espèces

Cette amanite se caractérise par son chapeau gris brunâtre, nu ou orné de flocons vélaires gris et à marge non sillonnée ou légèrement striée à maturité. Son pied a un gros bulbe marginé et son voile secondaire est gris. On la rencontre d'août à octobre sous les conifères.	**7,2** **AMANITE PORPHYRE** ***AMANITA PORPHYRIA***
Cette variété d'amanite citrine se caractérise par son chapeau gris, plus foncé au centre, et par son gros bulbe marginé à la base du pied. Il en existe une variété à chapeau jaune verdâtre décrite à 3.2 et une variété blanche décrite à 5.8. L'amanite citrine fructifie tout au long de l'été et de l'automne dans une grande variété d'habitats.	**7.3** **AMANITE CITRINE** ***A. citrina***

PAGE SUIVANTE

GROUPE-7 : VOILE SECONDAIRE PRÉSENT, CHAPEAU GRIS À GRIS NOIRÂTRE, À BRUN FONCÉ.

SUITE

4 espèces

Pied non bulbeux émergeant d'une volve blanche.	**L'amanite dédaignée possède un chapeau allant de gris brunâtre à brunâtre, à marge sillonnée. Son pied blanchâtre est non bulbeux et émerge d'une volve blanche en forme de sac; son voile secondaire est blanc. Elle fructifie de juillet à septembre sous les bouleaux et les peupliers poussant sur des sols sablonneux.**	**7,6** **AMANITE DÉDAIGNÉE** ***AMANITA SPRETA***
Pied bulbeux, bulbe atténué vers le haut.	**Cette petite amanite a un chapeau jaunâtre à gris-brun nu ou orné de flocons vélaires blancs à grisâtres et sa marge est non sillonnée. Son pied blanc et bulbeux porte un voile secondaire également blanc (ou jaune pâle) et il est issu d'une volve blanche. On peut la rencontrer de juillet à septembre sous les feuillus à bois dur.**	**7,7** **AMANITE LIGNOPHILE** ***AMANITA LIGNOPHILA***
	Cette amanite de grande taille a un chapeau allant de brun à gris-brun foncé, nu ou orné de flocons blancs à grisâtre et sa marge est non sillonnée ou courtement striée à maturité. Son pied blanc porte un voile secondaire également blanc et son bulbe est non marginé. Elle fructifie de juillet à septembre sous les feuillus à bois dur.	**7,8** **A. FAUSSE BRUNISSANT** ***A. SUBMACULATA***
	Le trait distinctif de cette amanite est d'avoir le dessous du voile secondaire de couleur orangée. Le chapeau est de couleur brune palissant avec l'âge, nu ou orné de restes vélaires jaune pâle à gris brunâtre; la marge est non sillonnée ou légèrement sillonnée à maturité. Le dessus du voile secondaire est gris et le pied bulbeux atténué vers le haut. On peut la rencontrer en fin d'été ou en automne sous les résineux ou les feuillus.	**7,9** **AMANITE DE MORRIS** ***AMANITA MORRISII***